Vestnik zoologii **34**(6): 80, 2000

Vestnik zoologii
Journal of Schmalhausen Institute of Zoology

ЗАМЕТКА

Про сучасні знахідки лісового кота (*Felis silvestris*) в пониззі ріки Дністер [New Records of the European Wild Cat (*Felis silvestris*) in the River of Dnestr]. — З часів О. О. Браунера відомо про існування лісового кота в заплаві Дністра. Незважаючи на спеціальні пошуки впродовж тривалого часу (1982–1998 рр.) окрім свідчень про регулярні зустрічі вказаного виду в заплавних лісах та заростях очерету, ніяких фактичних матеріалів зібрати не вдалося. Натомість дослідження майже 50 котів, відловлених капканами та відстріляних мисливцями, показали їхню повну належність до свійської форми. Лише у грудні 1985 р. в районі оз. Лісове мисливцями випадково було впольовано молоду самку *Felis silvestris* Schr. Видову належність цього єдиного екземпляра, який знаходиться у приватній колекції, вдалося підтвердити особисто. Вказані обставини дозволяють стверджувати про повну сучасну відсутність виду в дельті р. Дністра (Роженко, 1999). Але 17.12.1999 при полюванні на єнотовидного собаку та лисицю у вечірніх сутінках мисливці в дністровьких плавнях біля с. Яски Біляївського р-ну Одеської обл. помилково застрелили молодого самця лісового кота, з якого нам вдалося зняти проміри: L тіла зі спини — 56 см; C — 29; A — 6; L від кігтів до ліктьового згину — 21; L від кігтів до колінного згину — 25; обхват грудей — 33 см. Максимальна довжина черепа склала — 94,9 мм; кондило-базальна — 86,0; скулова ширина — 63,1; міжочна — 11,8; ширина очних виступів — 41,7; висота черепа — 43,4 і довжина нижньої щелепи — 60,1 мм. У шлунку було знайдено 11 перегризених майже навпіл гризунів, серед них 1 маленька миша (*Micromys minutus* Pall.), 5 лісових мишей (*Sylvaemus silvaticus* L.) і 5 сірих хом`ячків (*Cricetulus migratorius* Pall.). Череп було передано в фонди Національного науково-природничого музею НАН України, Київ. Складається враження, що поодинокі особини зазначеного виду проникають в заплавні дністровські ліси внаслідок міграції із молдавських Кодр, де знаходяться найближчі поселення даного виду. — **М. В. Роженко** (Одеський державний університет ім. І. І. Мєчникова).

ЗАМЕТКА

О современных находках лесного кота на Буковине [New Records of the European Wild Cat in the Bucovina]. — Современное распространение лесного кота *Felis silvestris* Schr. в Черновицкой обл. ограничивается спелыми буково-елово-пихтовыми лесами в пределах Глыбокского (n=25), Заставненского (n=4), Новоселицкого (n=2), Сторожинецкого (n=37), Путильского (n=3) и Хотинкого (n=3) районов. По нашей предварительной оценке, численность вида в регионе превышает 70 особей. Для выведения котят животные часто используют норы барсука и лисицы, реже — дупла старых деревьев. 2.03.1998 г. на вырубке, поросшей кипреем. В Верхне-Петровецком лесничестве (Глыбокский р-н) при невыясненных обстоятельствах охотниками был застрелен крупный самец лесного кота (L по брюху — 68 см, по спине — 63; C — 25,8; A — 6,0; P — 14,5; обхват груди — 32 см). Животное было слабо упитано, в желудке обнаружено 4 рыжих полевки (*Clethrionomys glareolus* Schr.), над глазом — 1 экз. *Ixodes ricinus.* Максимальная длина черепа составила 103,3 мм; кондило-базальная длина — 93,4; скуловая ширина — 72,0; межглазничная ширина — 20,3; высота черепа — 40,7 мм. Законсервированная шкурка кота и череп переданы в фонды Национального научно-природоведческого музея НАН Украины, Киев. — **Ю. Б. Ткачук** (Таврическая агротехническая академия, Мелитополь).